

LA MANERA EN QUE TOMA SYNTHROID IMPORTA

Synthroid®
(levothyroxine sodium tablets, USP)

ASEGÚRESE DE QUE SEA SYNTHROID

Revise el comprimido y asegúrese de que diga "SYNTHROID" en el comprimido con cada renovación. Marque con un círculo la dosis recetada:



Los comprimidos que se ven no son de tamaño real y podrían no representar el color exacto.

CÓMO TOMAR SYNTHROID DE LA MANERA CORRECTA

La cantidad de medicamento que necesita es muy precisa. Por eso, es fundamental tomar Synthroid de forma correcta, todos los días, para que sea eficaz. Es importante que siempre tome el medicamento tal como se lo recetó su médico.

Tome Synthroid de la siguiente manera:



Una vez al día, a la misma hora, todos los días



Solo con agua y con el estómago vacío antes de la primera comida



Esperar entre 30 y 60 minutos antes de comer o beber algo que no sea agua

Recuerde que ciertos alimentos y suplementos pueden interferir con Synthroid.



Algunos alimentos e ingredientes pueden reducir la eficacia de Synthroid, como la harina de soja, las nueces, el jugo de toronjas, la harina de semilla de algodón y la fibra alimenticia.



Ciertos suplementos y medicamentos pueden afectar la absorción de Synthroid. Tome Synthroid 4 horas antes o después de tomar hierro o suplementos que contengan hierro, calcio o suplementos que contengan calcio y antiácidos.



La biotina puede interferir con los inmunoanálisis para TSH. Interrumpa la biotina y los suplementos que contengan biotina durante al menos 2 días antes de evaluar los niveles de TSH y/o T4.

Consulte la sección completa de Uso y la Información de seguridad importante, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA, en el reverso de esta página.

Haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluida la Guía del medicamento.

QUÉ ESPERAR A LARGO PLAZO

Es posible que sea necesario ajustar su dosis. Hable francamente con su médico sobre los cambios en su vida, por ejemplo:



Cómo se siente y cambios en los síntomas



Embarazo



Menopausia



Envejecimiento

Escanee para conocer las maneras de ahorrar con Synthroid



Concierte su próxima cita antes del

SYNTHROID es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar una afección llamada hipotiroidismo. No debe usarse para tratar neoplasias benignas de la tiroides ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes con niveles normales de yodo ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

Consideraciones de seguridad:

Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. Las dosis altas de hormona tiroidea, especialmente cuando se usan con ciertos fármacos que reducen el apetito, pueden producir efectos graves e incluso potencialmente mortales.

abbvie

USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

USO

SYNTHROID® (levotiroxina sódica) en comprimidos, para uso oral, es una hormona tiroidea sintética de venta con receta que se usa para tratar una enfermedad denominada hipotiroidismo en adultos y niños, incluidos los lactantes. Su función es reemplazar una hormona que es producida normalmente por la glándula tiroidea. En general, el tratamiento de

reemplazo tiroideo debe tomarse de por vida. SYNTHROID no debe usarse para tratar neoplasias benignas ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes con niveles normales de yodo, ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• **Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse solas ni en combinación con otros fármacos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. En pacientes con niveles normales de la hormona tiroidea, las dosis de SYNTHROID usadas una vez al día para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso. Las dosis mayores pueden causar eventos graves o incluso potencialmente mortales, en especial cuando se usan en combinación con ciertos fármacos que reducen el apetito.**

- No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tomar demasiado o muy poco SYNTHROID puede provocar efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo, en la función del corazón, la salud ósea, en la función reproductiva, la salud mental, en la función digestiva y cambios en el metabolismo del colesterol y el azúcar en sangre en pacientes adultos o pediátricos.
- Tomar demasiada levotiroxina puede afectar su corazón, especialmente si es mayor o si tiene una cardiopatía. Informe a su médico de inmediato si tiene signos de aumento del ritmo cardíaco, dolor en el pecho o latidos cardíacos irregulares.
- Informe a su médico sobre cualquier otra enfermedad que pueda tener, especialmente cardiopatías, diabetes, trastornos de la coagulación y problemas de la glándula suprarrenal o la hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que pueda estar tomando para controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre o de glucosa en orina, según lo indique su médico, e infórmele de inmediato sobre cualquier cambio. Si toma anticoagulantes, debe controlar con frecuencia su estado de coagulación sanguínea.
- El uso excesivo de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, en especial en las mujeres después de la menopausia.
- Informe a su médico si está embarazada o amamantando, o si planifica quedar embarazada mientras toma SYNTHROID. Es posible que durante el embarazo se deba aumentar su dosis de SYNTHROID.
- Informe a su médico si empieza a experimentar cualquiera de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, calambres en las piernas, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso, vómitos, diarrea, sudoración excesiva,

intolerancia al calor, fiebre, cambios en el período menstrual, protuberancias rojas en la piel (urticaria) o erupciones cutáneas, o cualquier otro evento médico inusual.

- Se puede producir una pérdida parcial del cabello durante los primeros meses al tomar SYNTHROID.
- Informe a su médico sobre cualquier otro fármaco que esté usando, incluidos productos de venta con receta y de venta libre.
- Los productos como los suplementos de hierro y calcio y los antiácidos pueden reducir la capacidad del cuerpo para absorber levotiroxina, por lo que SYNTHROID debe tomarse 4 horas antes o después de usar estos productos.
- Informe a su médico o dentista que está tomando SYNTHROID antes de someterse a cualquier procedimiento.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tome SYNTHROID como una dosis única, preferentemente con el estómago vacío, entre media hora y una hora antes del desayuno.
- Una vez que su médico haya encontrado su dosis específica de SYNTHROID, es importante realizarse pruebas de análisis de laboratorio periódicas y evaluaciones clínicas para evaluar su respuesta al tratamiento.
- Los alimentos como la harina de soja, la harina de semilla de algodón, las nueces y la fibra alimenticia pueden hacer que su organismo absorba menos SYNTHROID a través del tracto gastrointestinal. El jugo de toronjas puede hacer que su organismo absorba menos levotiroxina y puede reducir su efecto. Informe a su médico si consume estos alimentos, ya que es posible que deba ajustar su dosis de SYNTHROID.
- Pueden pasar varias semanas antes de que note una mejoría en sus síntomas.

Esta es la información de seguridad más importante que debe conocer acerca de SYNTHROID. Para obtener más información, hable con su médico.

Haga clic aquí para ver la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

Se le recomienda informar a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría brindarle ayuda. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.