

# Synthroid®

(levothyroxine sodium tablets, USP)



**Synthroid ha ayudado a millones de personas a mantener el equilibrio de los niveles de hormonas tiroideas**



## USO

SYNTHROID® (levotiroxina sódica) en comprimidos, para uso oral, es una hormona tiroidea sintética de venta con receta que se usa para tratar una enfermedad denominada hipotiroidismo en adultos y niños, incluidos los lactantes. Su función es reemplazar una hormona que es producida normalmente por la glándula tiroidea. En general, el tratamiento de reemplazo tiroideo debe tomarse de por vida. SYNTHROID no debe usarse para tratar neoplasias benignas ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes con niveles normales de yodo, ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Las hormonas tiroideas, entre ellas SYNTHROID, no deben usarse solas o en combinación con otros fármacos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. En pacientes con niveles normales de la hormona tiroidea, las dosis de SYNTHROID usadas una vez al día para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso. Las dosis mayores pueden causar eventos graves o incluso potencialmente mortales, en especial cuando se usan en combinación con ciertos fármacos que reducen el apetito.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la página 18.

Consulte la [Información de prescripción](http://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid_spa.pdf) completa o visite [www.rxabbvie.com/pdf/synthroid\\_spa.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid_spa.pdf)



## **CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)**

- No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tomar demasiado o muy poco SYNTHROID puede provocar efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo, en la función del corazón, la salud ósea, en la función reproductiva, la salud mental en la función digestiva y cambios en el metabolismo del colesterol y el azúcar en sangre en pacientes adultos o pediátricos.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional, así como el **RECUADRO** de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la página 18.**

**Consulte la información completa sobre la prescripción.**

## Los médicos han recetado Synthroid durante más de 60 años para ayudar a mantener el equilibrio de los niveles de hormonas tiroideas

Si no ha encontrado la solución adecuada para su hipotiroidismo, conozca más sobre Synthroid en este folleto y pregunte a su médico si Synthroid es adecuado para usted. A millones de personas que viven con hipotiroidismo, como Tracy, se les ha recetado Synthroid para ayudar a mantener el equilibrio de los niveles de hormonas tiroideas.



**Llevo 14 años tomando Synthroid y** mantiene mis niveles de TSH donde deberían estar.

- Tracy, que vive con hipotiroidismo



Vea la historia de Tracy en [Synthroid.com](https://www.synthroid.com)

Synthroid®  
(levothyroxine sodium tablets, USP)




# Cómo actúa Synthroid

## Restauración de sus niveles de hormonas tiroideas

Cuando tiene hipotiroidismo, la glándula tiroidea no produce suficientes hormonas tiroideas. Como resultado, el sistema de su cuerpo se ralentiza.

Synthroid es un medicamento de venta con receta que ayuda a restaurar los niveles de la hormona estimulante de la tiroides (thyroid-stimulating hormone, TSH) y sustituye la cantidad de tiroxina que le falta a su cuerpo. El ingrediente activo en Synthroid es levotiroxina sódica, una hormona sintética que actúa de la misma manera que la tiroxina.



Para obtener más información, vea nuestro breve video animado en [Synthroid.com](https://www.synthroid.com)

El comprimido que se muestra no es de tamaño real y podría no representar el color exacto.

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**4 Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**

# Qué esperar al empezar a tomar Synthroid

Al igual que con cualquier tratamiento contra el hipotiroidismo, puede llevarles algún tiempo a usted y a su médico encontrar la dosis de Synthroid que sea más eficaz para usted. Incluso después de encontrar la dosis adecuada, pueden pasar varias semanas antes de que los niveles de hormonas tiroideas se ajusten y usted note una mejora en los síntomas. Intente ser paciente. A continuación, asegúrese de tomar su Synthroid de la forma correcta todos los días para que actúe correctamente.

## De la manera correcta, todos los días



Tome Synthroid una vez al día, todos los días, a la misma hora antes del desayuno.



Tome Synthroid con agua solamente y con el estómago vacío.



Espere entre 30 minutos y 1 hora antes de comer o beber algo que no sea agua.



### ¿Lo sabía?

**Las nueces pueden afectar la forma en que Synthroid se absorbe en el cuerpo.**

Conozca otros alimentos que interfieren en la absorción de Synthroid.

Para obtener más información, lea la **Guía para tomar Synthroid de la forma correcta adjunta.**

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Tomar demasiada levotiroxina puede afectar su corazón, especialmente si es mayor o si tiene una cardiopatía. Informe a su médico de inmediato si tiene signos de aumento del ritmo cardiaco, dolor en el pecho o latidos cardiacos irregulares.

Synthroid®

*(levothyroxine sodium tablets, USP)*



# La administración de la dosis precisa importa

## No existe una solución “única” para el hipotiroidismo

Cada persona con hipotiroidismo requiere una cantidad precisa de medicamento para satisfacer sus necesidades únicas. E incluso los pequeños cambios en la dosis o la absorción de su medicamento pueden tener un gran impacto en sus niveles de hormonas tiroideas y en cómo se siente.

Con 12 opciones de administración de dosis precisas de Synthroid, su médico tiene la flexibilidad de encontrar la dosis que satisfaga sus necesidades individuales y conseguir que sus niveles de hormonas tiroideas se encuentren en el rango adecuado para usted.



Los comprimidos que se ven no son de tamaño real y podrían no representar el color exacto.

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**6 Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**



## Encontrar la dosis adecuada con su médico

Cuando empiece a tomar Synthroid por primera vez, su médico normalmente analizará sus niveles de hormonas tiroideas cada 6 a 8 semanas. Dado que las necesidades de hormonas tiroideas son muy precisas, es posible que su médico necesite hacer pequeños ajustes para encontrar la dosis adecuada para usted. Pueden pasar varias semanas antes de que note que Synthroid está actuando y que sus niveles de hormonas tiroideas se ajusten al nivel correcto.

### CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su médico sobre cualquier otra enfermedad que pueda tener, especialmente cardiopatías, diabetes, trastornos de la coagulación y problemas de la glándula suprarrenal o la hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que pueda estar tomando para controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre o de glucosa en orina, según lo indique su médico, e infórmele de inmediato sobre cualquier cambio. Si toma anticoagulantes, debe controlar con frecuencia su estado de coagulación sanguínea.

Synthroid®  
(levothyroxine sodium tablets, USP)



# Use Synthroid de manera constante

## ¿Lo sabía?

Existen varios fabricantes que elaboran su propio medicamento genérico de levotiroxina. Y las farmacias a veces cambian de fabricantes a los que compran la levotiroxina. Por lo tanto, si está tomando un medicamento genérico para controlar su hipotiroidismo, es posible que obtenga un medicamento de levotiroxina diferente cuando vuelva a surtir su receta. Aunque su médico le haya recetado la marca Synthroid, existe la posibilidad de que su farmacia tenga que sustituirla por una levotiroxina genérica si su médico no especificó que la marca era médicamente necesaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha determinado que ciertos tipos de levotiroxina son intercambiables, y las farmacias pueden sustituirlos.



### La marca Synthroid

Cuando su médico le recete Synthroid, pida en la farmacia la marca Synthroid para saber que siempre está recibiendo el mismo medicamento del mismo fabricante cada vez que vuelva a surtir la receta.

El comprimido que se muestra no es de tamaño real y podría no representar el color exacto.

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**8 Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**



En la consulta del médico, hemos decidido que este le indicará a mi farmacia que me entreguen **específicamente Synthroid**

- Wendy, una paciente con hipotiroidismo que toma Synthroid.

Vea cómo Wendy obtiene la receta de Synthroid en la farmacia, según lo indicado por su médico, en **Synthroid.com**

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

El uso excesivo de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, en especial en las mujeres después de la menopausia.

Synthroid®  
(*levothyroxine sodium tablets, USP*)



## 2 opciones para ahorrar con Synthroid

### OPCIÓN 1

#### Tarjeta de ahorro de copagos de Synthroid

Los pacientes con seguro comercial pagarán apenas \$25 al mes con la tarjeta de copagos.

Elegibilidad: Disponible para los pacientes con cobertura de seguro comercial para Synthroid® (levotiroxina sódica) que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Este programa de asistencia para copago no está disponible para los pacientes que reciben reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de un programa de seguro federal, estatal o financiado por el gobierno (por ejemplo, los programas Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos]), o donde lo prohíba la ley. Oferta sujeta a cambio o finalización sin previo aviso. Pueden aplicarse restricciones, incluidas cantidades máximas mensuales. Este no es un seguro de salud. **Para conocer todos los Términos y condiciones, visite [SYNTHROID SavingsCard.com](https://synthroid.com/SynthroidSavingsCard) o llame al 1-866-627-4980 para obtener más información.** Para obtener información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y sus opciones de privacidad, visite <https://abbv.ie/corpprivacy>.



#### Programa de asistencia al paciente

Regístrese hoy en [Synthroid.com](https://synthroid.com) para recibir ahorros, herramientas y recursos educativos que ayudarán con su tratamiento.

#### CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su médico si está embarazada o amamantando, o si planifica quedar embarazada mientras toma SYNTHROID. Es posible que durante el embarazo se deba aumentar su dosis de SYNTHROID.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**

# LA MARCA SYNTHROID CON ENTREGA DIRECTA EN SU PUERTA

Solo paga **\$25 al mes** por una receta para 90 días.<sup>†</sup>  
Obtenga entrega a domicilio conveniente y gratuita con cada pedido.

Synthroid® *Delivers*  
PROGRAM

## OPCIÓN 2



### Siempre la marca Synthroid con cada resurtido

No tendrá que preocuparse nunca por obtener un medicamento diferente —su receta nunca se surtirá con un medicamento genérico de levotiroxina sódica.



### Obtenga la marca Synthroid con entrega a domicilio gratuita de forma sistemática y conveniente.

Con el **Programa Synthroid Delivers**, todas las personas con una receta de Synthroid pagan el mismo precio, cada vez, sin costos de bolsillo ocultos ni fluctuaciones de precios. **El programa no utiliza ni acepta seguros.** Un precio de tan solo **\$25 al mes** por una receta para 90 días, independientemente de la condición de su seguro.\*



### Apoyo del equipo de farmacia

El apoyo en directo del equipo de farmacia ayuda a responder sus preguntas sobre Synthroid. **Llame al (844) GET-SYNTHROID, 844-438-7968, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este.**

Visite [SynthroidDeliversProgram.com](https://SynthroidDeliversProgram.com) para inscribirse en el **Programa Synthroid Delivers** y ahorre en Synthroid.

<sup>†</sup>Otros precios disponibles para 30 (\$29.50) y 60 (\$54) días. Consulte toda la información sobre precios en SynthroidDeliversProgram.com. Se aplican términos, condiciones y restricciones de elegibilidad al Programa Synthroid Delivers.

El comprimido que se muestra no es de tamaño real y podría no representar el color exacto.



Synthroid®  
(levothyroxine sodium tablets, USP)



# Qué esperar a largo plazo

Generalmente, el hipotiroidismo es una afección de por vida que requiere tratamiento de por vida. Si continúa tomando Synthroid como le recetó su médico y se somete a un control periódico de sus niveles, puede ayudar a mantener sus niveles de hormonas tiroideas donde deberían estar.



## Ajustes de la dosis a lo largo del tiempo

A lo largo de toda su vida, es posible que su médico tenga que ajustar su dosis de Synthroid. Esto se debe a que la cantidad de hormonas tiroideas que necesita el cuerpo puede cambiar. Algunos de los motivos pueden incluir eventos importantes de la vida, como el embarazo, la menopausia o el envejecimiento.

## Su rol en el tratamiento

Mantener el equilibrio de los niveles de hormonas tiroideas requiere compromiso. Y eso significa algo más que tomar un comprimido una vez al día. Esto significa lo siguiente:

- Continuar tomando Synthroid de la manera correcta
- Controlar regularmente sus niveles de hormonas tiroideas
- Mantener informado a su médico sobre cómo se siente y sobre cualquier síntoma nuevo que presente

Al desempeñar un papel activo en el tratamiento de su hipotiroidismo, puede ayudar a mantener sus niveles de hormonas tiroideas donde deben estar.

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**12 Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**



# Asegúrese de recibir Synthroid

Una de cada 3 personas que creen que reciben Synthroid en realidad no lo reciben.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha determinado que ciertos productos de levotiroxina son intercambiables y pueden sustituirse en la farmacia.

## Formas para obtener Synthroid como le indicó su médico



**1. Pídale a su médico que indique su preferencia** en la receta.

Si no se incluyen instrucciones específicas, por ejemplo, la sigla DAW (Dispense as written [surtir según lo indicado]), es posible que le cambien el medicamento sin que usted lo sepa, según la ley estatal que rige a su farmacia.



**2. Informe al farmacéutico o al servicio de pedidos por correo** que su médico prefiere la marca Synthroid.



**3. Revise sus comprimidos.** Antes de salir de la farmacia o en cuanto llegue su medicamento de venta con receta, compruebe que en el comprimido diga "SYNTHROID". En caso contrario, comunique a su farmacéutico que quiere lo que prefiere su médico.

## También puede inscribirse en el *Programa Synthroid Delivers*.

Un programa de farmacia directo al paciente con pagos en efectivo, mediante el cual recibirá el medicamento comercial Synthroid a su hogar todos los meses, sin sustituciones.

Synthroid® *Delivers*  
PROGRAM

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su médico si empieza a experimentar cualquiera de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, calambres en las piernas, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, intolerancia al calor, fiebre, cambios en el período menstrual, protuberancias rojas en la piel (urticaria) o erupciones cutáneas, o cualquier otro evento médico inusual.

Synthroid®  
(*levothyroxine sodium tablets, USP*)



## Es importante que hable con su médico

El hipotiroidismo no es solo una cuestión de cifras de la TSH. Se trata de algo que va más allá de un análisis de sangre. También se trata de cómo se siente usted.

Escuche a su cuerpo. Si considera que algo no está bien, asegúrese de analizarlo con su médico. Mantener una conversación abierta y sincera con su médico puede ayudarlos a ambos a entender lo que usted está experimentando y a encontrar posibles soluciones.

### Datos básicos para la conversación

- 
- Describa cualquier sentimiento que lo haya preocupado. ¿Podría estar relacionado con el hipotiroidismo?
  - ¿Qué tipos de síntomas puede causar el hipotiroidismo?
  - ¿Cómo me siento con respecto a cómo está funcionando mi régimen de tratamiento actual contra el hipotiroidismo? ¿Por qué me siento así?
  - ¿Qué debo esperar de mi tratamiento contra el hipotiroidismo?
  - ¿Hay algo más que podría hacer para ayudar a controlar mi hipotiroidismo?
  - ¿Cómo puedo asegurarme de que mi farmacia me dé el medicamento que usted, el médico, me receta?

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**14 Consulte la [información completa sobre la prescripción](#).**



**CONSIDERACIONES  
IMPORTANTES DE SEGURIDAD**  
(CONTINUACIÓN)

Se puede producir una pérdida parcial del cabello durante los primeros meses al tomar SYNTHROID.

Synthroid®  
(levothyroxine sodium tablets, USP)



# Entender el hipotiroidismo

## A más de 30 millones de adultos estadounidenses se les ha diagnosticado hipotiroidismo

El hipotiroidismo afecta a personas de todas las edades y sectores sociales. Las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres. Las personas mayores de 60 años (especialmente las mujeres) y las mujeres embarazadas también son más propensas a padecer hipotiroidismo que otras.

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroidea no produce suficientes hormonas tiroideas. Esto hace que el sistema del cuerpo se ralentice y puede provocar síntomas como fatiga, sensación de frío, aumento de peso debido a la retención de líquidos, piel seca y caída del cabello.


### Síntomas

Algunos de los síntomas principales del hipotiroidismo incluyen los siguientes:

- Habla o movimientos más lentos
- Inflamación de la glándula tiroidea
- Sangrado menstrual abundante o períodos irregulares
- Dolor muscular y articular
- Debilidad muscular
- Dificultad para pensar y concentrarse
- Sentirse deprimido
- Olvidos
- Poca energía
- Estreñimiento
- Hinchazón de piernas, tobillos o pies

**Hable con su médico si presenta alguno de estos síntomas. Es posible que quiera comprobar su nivel de TSH.**

**Consulte la Información de seguridad importante, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**



## La importancia de la TSH en el hipotiroidismo

TSH es la abreviatura de “hormona estimulante de la tiroides”. Esta la libera una pequeña glándula del cerebro llamada hipófisis. La TSH es la hormona que regula la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4 en la glándula tiroidea, que ayudan a regular muchas funciones corporales. Dependiendo de los niveles de T3 y T4 en el cuerpo, la hipófisis libera más o menos TSH según sea necesario.

Las personas con hipotiroidismo no pueden producir la cantidad suficiente de hormonas tiroideas que su cuerpo necesita. El cuerpo responde y envía señales al cerebro para que produzca más TSH en un intento de estimular la tiroides. Esto provoca niveles elevados de TSH y niveles bajos de hormonas tiroideas, lo que se asocia con el hipotiroidismo.

### La prueba de la TSH



La prueba de la TSH se utiliza para comprobar el nivel de la hormona estimulante de la tiroides en la sangre. Su nivel de TSH puede indicar si su glándula tiroidea está funcionando correctamente.

Una vez que le hayan diagnosticado hipotiroidismo y su médico le haya recetado un plan de tratamiento, es importante que se someta a pruebas periódicas de la TSH. Esto determinará si es necesario hacer algún ajuste en la dosis de su medicamento antitiroideo o en cómo toma su medicamento.

Por mucho que sepa, es importante seguir aprendiendo sobre su afección. Cuanto mejor entienda el hipotiroidismo, más preparación tendrá para tratarlo.

### CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su médico sobre cualquier otro fármaco que esté usando, incluidos productos de venta con receta y de venta libre.

Synthroid®  
(levothyroxine sodium tablets, USP)



# Uso e información de seguridad importante

## USO

SYNTHROID® (levotiroxina sódica) en comprimidos, para uso oral, es una hormona tiroidea sintética de venta con receta que se usa para tratar una enfermedad denominada hipotiroidismo en adultos y niños, incluidos los lactantes. Su función es reemplazar una hormona que es producida normalmente por la glándula tiroidea. En general, el tratamiento de reemplazo tiroideo debe tomarse de por vida. SYNTHROID no debe usarse para tratar neoplasias benignas ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes con niveles normales de yodo, ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- **Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse solas ni en combinación con otros fármacos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. En pacientes con niveles normales de la hormona tiroidea, las dosis de SYNTHROID usadas una vez al día para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso. Las dosis mayores pueden causar eventos graves o incluso potencialmente mortales, en especial cuando se usan en combinación con ciertos fármacos que reducen el apetito.**
- No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tomar demasiado o muy poco SYNTHROID puede provocar efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo, en la función del corazón, la salud ósea, en la función reproductiva, la salud mental, en la función digestiva y cambios en el metabolismo del colesterol y el azúcar en sangre en pacientes adultos o pediátricos.
- Tomar demasiada levotiroxina puede afectar su corazón, especialmente si es mayor o si tiene una cardiopatía. Informe a su médico de inmediato si tiene signos de aumento del ritmo cardiaco, dolor en el pecho o latidos cardiacos irregulares.
- Informe a su médico sobre cualquier otra enfermedad que pueda tener, especialmente cardiopatías, diabetes, trastornos de la coagulación y problemas de la glándula suprarrenal o la hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que pueda estar tomando para controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre o de glucosa en orina, según lo indique su médico, e infórmele de inmediato sobre cualquier cambio. Si toma anticoagulantes, debe controlar con frecuencia su estado de coagulación sanguínea.

- El uso excesivo de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, en especial en las mujeres después de la menopausia.
- Informe a su médico si está embarazada o amamantando, o si planifica quedar embarazada mientras toma SYNTHROID. Es posible que durante el embarazo se deba aumentar su dosis de SYNTHROID.
- Informe a su médico si empieza a experimentar cualquiera de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, calambres en las piernas, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, intolerancia al calor, fiebre, cambios en el período menstrual, protuberancias rojas en la piel (urticaria) o erupciones cutáneas, o cualquier otro evento médico inusual.
- Se puede producir una pérdida parcial del cabello durante los primeros meses al tomar SYNTHROID.
- Informe a su médico sobre cualquier otro fármaco que esté usando, incluidos productos de venta con receta y de venta libre.
- Los productos como los suplementos de hierro y calcio y los antiácidos pueden reducir la capacidad del cuerpo para absorber levotiroxina, por lo que SYNTHROID debe tomarse 4 horas antes o después de usar estos productos.
- Informe a su médico o dentista que está tomando SYNTHROID antes de someterse a cualquier procedimiento.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tome SYNTHROID como una dosis única, preferentemente con el estómago vacío, entre media hora y una hora antes del desayuno.
- Una vez que su médico haya encontrado su dosis específica de SYNTHROID, es importante realizarse pruebas de análisis de laboratorio periódicas y evaluaciones clínicas para evaluar su respuesta al tratamiento.
- Los alimentos como la harina de soja, la harina de semilla de algodón, las nueces y la fibra alimenticia pueden hacer que su organismo absorba menos SYNTHROID a través del tracto gastrointestinal. El jugo de toronjas puede hacer que su organismo absorba menos levotiroxina y puede reducir su efecto. Informe a su médico si consume estos alimentos, ya que es posible que deba ajustar su dosis de SYNTHROID.
- Pueden pasar varias semanas antes de que note una mejoría en sus síntomas.

**Esta es la información de seguridad más importante que debe conocer acerca de SYNTHROID.**

**Para obtener más información, hable con su médico.**

**Se le recomienda informar a la Administración de Medicamentos y Alimentos**

**los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta.**

**Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.**

**Si tiene dificultades para pagar su medicamento,**

**AbbVie podría brindarle ayuda. Visite [AbbVie.com/myAbbVieAssist](http://AbbVie.com/myAbbVieAssist) para obtener más información.**

Synthroid®

*(levothyroxine sodium tablets, USP)*



**Consulte la [información de prescripción completa](#).**



**Synthroid es la marca comercial n.º 1 para el tratamiento del hipotiroidismo.**



### Nuestra garantía

Los comprimidos de Synthroid no contienen ingredientes fabricados con granos que contienen gluten (trigo, cebada o centeno).



### Síguenos en Facebook e Instagram

Conéctese con otras personas, descubra nueva información y reciba actualizaciones continuas sobre Synthroid.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- **Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. Las dosis altas de hormona tiroidea, especialmente cuando se usan con ciertos fármacos que reducen el apetito, pueden producir efectos graves e incluso potencialmente mortales.**
- No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tomar demasiado o muy poco SYNTHROID puede provocar efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo, en la función del corazón, la salud ósea, en la función reproductiva, la salud mental, en la función digestiva y cambios en la glucosa y el metabolismo de los lípidos en pacientes adultos o pediátricos.
- Tomar demasiada levotiroxina puede afectar su corazón, especialmente si es mayor o si tiene una cardiopatía. Informe a su médico de inmediato si tiene signos de aumento del ritmo cardíaco, dolor en el pecho o latidos cardíacos irregulares.
- Hable con su médico sobre todos los medicamentos que está usando, sus planes de embarazo y todas las afecciones médicas que pueda tener, especialmente cardiopatías, diabetes, trastornos de coagulación sanguínea y problemas de la glándula suprarrenal o la hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que pueda estar tomando para controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Informe a su médico que está tomando SYNTHROID antes de someterse a cualquier cirugía.
- Se ha asociado la terapia con cantidades excesivas de levotiroxina sódica con una disminución de la fuerza de los huesos, en especial en las mujeres después de la menopausia.
- Informe a su médico si experimenta latidos cardíacos rápidos o anormales, dolor en el pecho, dificultad para recuperar el aliento, calambres en las piernas, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambio en el apetito, pérdida o aumento de peso, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, dificultad para tolerar el calor, fiebre, cambios en el período menstrual, protuberancias rojas e hinchadas en la piel (urticaria) o erupción cutánea, o cualquier otro evento médico inusual.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional, así como el RECUADRO de advertencia sobre el tratamiento inapropiado de la obesidad o la pérdida de peso, en la [página 18](#).**

**Consulte la [Información de prescripción](#) completa o visite [www.rxabbvie.com/pdf/synthroid\\_spa.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid_spa.pdf)**

© 2024 AbbVie. Todos los derechos reservados.  
SYNTHROID® y su diseño son marcas comerciales registradas de AbbVie Inc.  
US-SYNT-240254 Diciembre de 2024

Synthroid®

*(levothyroxine sodium tablets, USP)*

